

63-1-1	
①	① ② ③ ④
②	① ② ③ 【初発症状】
③	
④	【麻酔法①】 【メリットとデメリット】
④	【麻酔法②】 【メリットとデメリット】

④	<p>【麻醉法③】</p> <p>【メリットとデメリット】</p>
⑤	
⑥	<p>%製剤</p> <p>【方法】</p> <p>【維持量】</p> <p>【その後】</p>
⑦	<p>①</p> <p>②</p> <p>③</p> <p>④</p>
⑧	

63-1-2	
①	① ② ③
②	【プロポフォール】  【ロクロニウム】  【スガマデクス】
③	
④	

⑤	
⑥	<p>【何が起きた？】</p> <p>【心電図】</p> <p>【原因】</p>

63-2-1	
①	<p>【リスク①-1】</p> <p>【リスク①-2】</p> <p>【リスク②-1】</p> <p>【リスク②-2】</p>
②	<p>【左室前負荷】</p> <p>【心拍数】</p> <p>【末梢血管抵抗】</p> <p>【心収縮力】</p>
③	<p>①</p> <p>②</p> <p>③</p> <p>④</p>

④	
⑤	割愛
⑥	<p><b>【所見】</b></p> <p>①</p> <p>②</p> <p>③</p> <p>④</p>
⑦	<p>①</p> <p>②</p> <p>③</p> <p>④</p> <p>⑤</p>

63-2-2	
①	① ② ③
②	① ② ③
③	① ②
④	
⑤	① ② ③ ④

⑥	
⑦	① ②
⑧	① ② ③ ④ ⑤



63-3-1	
①	① ② ③
②	① ② ③ ④
③	
④	① ②
⑤	
⑥	

⑦	
⑧	割愛

63-3-2	
①	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
②	① 割愛 ②-1 ②-2
③	( 必要 ・ 不必要 ) 【根拠】
④	
⑤	① ② ③

⑥	① ② ③
⑦	

63-4-1	
①	① ② ③ ④ ⑤
②	【導入薬】 【筋弛緩薬】
③	mm , cm
④	① ② ③ ④
⑤	① ② ③ ④

⑥	
⑦	① ② ③ ④
⑧	

63-4-2	
①	① ② ③
②	① ②
③	
④	
⑤	① ② ③ ① ② ③

⑥	① ② ③
⑦	① ② ③ ④ ⑤



63-5-1	
①	① ② ③ ④
②	① ② ③ ④ ⑤ ⑥  【発生率】            %
③	① ② ③ ④ ⑤

④	① ② ③ ④ ⑤
⑤	① ② ③ ④ ⑤
⑥	① ② ③ ④ ⑤
⑦	

63-5-2	
①	① ② ① ② ① ②
②	( A ・ B ・ C )
③	① ② ③

④	① ② ③ ④
⑤	① ②
⑥	

63-6-1	
①	① ②
②	
③	① ② ③ ④
④	① ② ③ ④

⑤	【診断名】
⑥	① ② ③
⑦	

63-6-2	
①	① ② ③ ④
②	( できる ・ できない )
③	
④	
⑤	割愛

⑥	① ② ③
⑦	( できる ・ できない )
⑧	① ② ③ ④