

56-1-1	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	① ② ③ ④ ⑤
1) ③	① ② ③ ④  【設定】
2) ①	

2) ②	① ② ③ ④ ⑤
3) ①	① ② ③ ④ ⑤
3) ②	【注意点】  【準備】  【確認事項】

3) ③	
------	--

56-1-2	
1) ①	<div>【薬物療法】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>【それ以外】</div>
1) ②	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div>
2) ①	
2) ②	<div>①</div> <div>②</div> <div>③</div>
2) ③	

3) ①	①  ②  ③
3) ②	
3) ③	

56-2-1	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	① ② ③ ④ ⑤
2) ①	【体位】 【導入方法】
2) ②	① ② ③ ④ ⑤

2) ③	① ② ③
2) ④	
2) ⑤	① ② ③ ④ ⑤
3) ①	① ② ③ ④ ⑤

56-2-2	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	
1) ③	
1) ④	
2) ①	① ② ③ ④ ⑤



3) ①	① ② ③ ④ ⑤
3) ②	

56-3-1	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
2) ①	
2) ②	
2) ③	① ② ③
2) ④	

2) ⑤	① ② ③
2) ⑥	① ② ③ ④ ⑤
2) ⑦	
3) ①	① ② ③

56-3-2	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	【クロピドグレル】 【アスピリン】 【ニコランジル】 【メトホルミン】 【オキシコドン】
1) ③	
1) ④	

1) ⑤	① ② ③ ④ ⑤
2) ①	
2) ②	① ② ③ ④
3) ①	① ② ③ ④ ⑤
3) ②	

56-4-1	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	
1) ③	
1) ④	① ② ③ ④ ⑤

1) ⑤	① ② ③ ④ ⑤
2) ①	① ② ③ ④ ⑤
2) ②	
2) ③	① ② ③ ④ ⑤

2) ④	① ② ③ ④ ⑤
3) ①	① ② ③



56-4-2	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	① ② ③ ④ ⑤
1) ③	
1) ④	

1) ⑤	
2) ①	① ② ③ ④ ⑤
2) ②	① ② ③
3) ①	
3) ②	

56-5-1	
1) ①	① ② ③ ④
1) ②	【利点】  【注意点】
1) ③	【サイズ】                    ( カフ有   ・   カフ無   )  【理由】
2) ①	① ②
2) ②	① ② ③

3) ①	① ② ③
4) ①	① ② ③ ④
4) ②	
4) ③	① ② ③
4) ④	

56-5-2	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	【根拠】  【対処】  ① ② ③ ④
1) ③	
1) ④	
2) ①	① ②

2) ②	① ② ③ ④ ⑤
3) ①	① ② ③ ④
3) ②	【鎮静】  【鎮痛】

56-6-1	
1) ①	① ② ③ ④ ⑤
1) ②	【テルミサルタン】 【メトホルミン】 【ダビガトラン】
1) ③	① ② ③ ④ ⑤
1) ④	【麻酔法と筋弛緩薬】 【気管チューブ】
2) ①	

2) ②	<div>【所見】</div> <div>①</div> <div>②</div> <div>③</div> <div>④</div>
3) ①	
3) ②	
3) ③	



56-6-2	
1) ①	
1) ②	① ② ③
1) ③	
1) ④	
2) ①	
2) ②	① ② ③
2) ③	

2) ④	
3) ①	① ② ③ ④ ⑤
3) ②	① ②